



PARCIAL DE ORINA

1

Realice aseo genital con agua y jabón antes de recoger la muestra. No debes usar ningún tipo de talco o crema porque alterará la calidad de la muestra y será necesario repetirla.

¡IMPORTANTE!

2

Lo ideal es recoger la primera orina de la mañana dado el grado de concentración en la que se encuentra. De lo contrario debe esperar al menos tres horas sin orinar antes de recogerla.

3

Preferiblemente utilice el frasco estéril que debe comprar en la droguería. No lo destape hasta el momento de usarlo.

4

Empiece a orinar y descarte la primera parte de la micción de la orina, continúe orinando y llene el frasco hasta la mitad. Descarte la última parte de la orina.

5

En el caso de las mujeres, no recoja la muestra durante el periodo menstrual. Espere de 4 a 6 días.

6

Tape bien el frasco y márkelo correctamente con sus nombres y apellidos.

7

Llévelo lo más pronto posible a Laboratorio, de lo contrario refrigere la muestra por un periodo máximo de una hora.

Examen rutinario que incluye una serie de pruebas selectivas o de detección, que permiten descubrir una variedad de enfermedades renales, del tracto urinario y sistémico.

De la calidad de la TOMA de la MUESTRA depende la CALIDAD del RESULTADO.